

Les Grands primates de la Forêt Classée de la LAMA



Réalisation : Dr Georges Nobimé

Laboratoire d'Ecologie Appliquée, Université d'Abomey-calavi
(01BP526 LEA-FSA-UAC, email: gnobime@gmail.com)



Cercopithecus e. erythrogaster



Famille : Cercopithecidae

Noms vernaculaires

Fon : Zinkaka, Zin-akonvè

Nagot : Aiyia-okaka

Etat de conservation

UICN : EN

Bénin : En danger critique d'extinction (CR)

Description Ce singe a une barbiche blanche et de poils dorés en forme de V renversé sur la tête. Le ventre et la poitrine ont une couleur rouge brique. La longueur de la tête et du tronc est entre 40 et 50 cm et la longueur de sa

queue entre 60 et 70 cm avec un poids de 2 à 4,5 kg. Biologie, écologie: La végétation des milieux humides est l'habitat préféré du singe à ventre rouge. Elle lui offre de bonnes conditions micro-climatiques, de quiétude et de refuge. Il se nourrit de fruits, de feuilles et d'insectes. Il s'associe à la mone et au colobe de van Beneden.

Ecologie

La végétation des milieux humides est l'habitat préféré du singe à ventre rouge. Elle lui offre de bonnes conditions microclimatiques, de quiétude et de refuge. Il se nourrit de fruits, de feuilles et d'insectes. Il s'associe à la mone et au colobe de Van Beneden.

Distribution géographique dans la Lama

Le singe à ventre rouge est surtout inféodé au noyau central de la forêt classée de la Lama. En effet, cette partie de la forêt constitue la végétation naturelle avec une mosaïque de forêt dense semi-décidue, de forêt dégradée et d'anciennes jachères. Il est rarement observé dans les plantations.

Usages : Ecotourisme, médecine

Menaces

Menaces	Score
Braconnage	
Destruction de l'habitat	

Actions prioritaires pour la conservation

Sensibilisation des populations, des touristes, des gardiens de la forêt et du personnel de l'ONAB ; mise en œuvre du plan de conservation du singe à ventre rouge élaboré par le laboratoire d'écologie appliquée.

Cercopithecus mona



Famille : Cercopithecidae

Noms vernaculaires

Fon : Zin-wi

Nagot : Aiya-doudou

Etat de conservation

UICN : LC

Bénin : VU

Description La mone montre un pelage brun avec un croupion blanc. Le visage est gris, avec un museau rose et une bande sombre de chaque œil à chaque oreille. Le ventre et l'intérieur des membres sont blancs. L'extérieur des pattes est noir tout comme la queue. La longueur de la tête et du tronc est comprise entre 40 et 60 cm tandis que sa queue mesure entre 45 et 80 cm. Son poids varie entre 3 et 6 kg.

Ecologie

Cette espèce fréquente les forêts secondaires humides, où elle se nourrit de fruits, de feuilles, d'insectes. Elle est également capable de dévaster les champs de maïs.

Distribution géographique dans la Lama

La mone inféodée au noyau central de la forêt classée de la Lama se retrouve fréquemment dans les champs riverains de la forêt, les plantations de teck et sur les pistes.

Usages : Ecotourisme, médecine

Menaces

Menaces	Score
Braconnage	
Destruction de l'habitat	

Actions prioritaires pour la conservation

Sensibilisation des populations, des touristes, du personnel de l'ONAB et des gardiens de la forêt

Chlorocebus aethiops tantalus



Famille : Cercopithecidae

Noms vernaculaires

Fon : Zin-abawé, Zin-ayiwè

Nagot : Aiya-founfoun

Etat de conservation

UICN : LC

Bénin : LC

Description

Le tantale est un petit singe à longue queue. La longueur de la tête et du tronc est de 45 à 56 cm et sa queue de 45 à 72 cm avec un poids de 5,5 à 9 kg. Avec son pelage vert grisâtre, ce singe a une face noire et des touffes blanches sur les joues et au dessus des yeux. Les abajoues sont très grandes et la longue queue est tachetée de noir au bout. Les testicules sont bleus chez l'adulte. La face ventrale et celle intime des pattes sont de couleur blanchâtre.

Ecologie

La durée de gestation est de Six mois, avec un petit par portée. Le tantale vit en bande et se réfugie dans les arbres à la moindre menace. Il se nourrit de fruits, d'insectes, de feuilles et parfois d'œufs et d'oiseaux.

Distribution géographique dans la Lama

Le tantale s'observe partout dans la forêt, dans le noyau central et les plantations de teck de la forêt classée de la Lama ainsi que sur les pistes.

Usages : Ecotourisme, médecine

Menaces

Menaces	Score
Braconnage	
Destruction de l'habitat	

Actions prioritaires pour la conservation

Sensibilisation des populations, des touristes, des gardiens de la forêt et du personnel de l'ONAB.

Procolobus verus



Famille : Colobidae

Noms vernaculaires

Fon : Zin-tchihié, Zin-noukouénoukoué

Etat de conservation

UICN : LC

Bénin : EN

Description

Le pouce est considérablement réduit. Le pelage est uniformément vert-brun sur le dos et blanc sur le ventre et la gorge. La longueur

de ce primate est de 43 à 50 cm avec une queue de 57 à 64 cm. Son poids est de 3 à 5,7 kg.

Ecologie

Le colobe olive est une espèce végétarienne, folivore. Les petits naissent entièrement blanc. Il y a un petit par portée, qui est quelque fois transporté dans la bouche de la mère pendant les premiers jours. L'espèce peut s'associer à d'autres primates comme la mone ou le cercopithèque à ventre rouge.

Distribution géographique dans la Lama

Le colobe olive est surtout inféodé au noyau central de la forêt classée de la Lama où il est souvent associé à la mone et au singe à ventre rouge. Il est rarement observé dans les plantations de teck et sur les pistes.

Usages : Ecotourisme, médecine

Menaces

Menaces	Score
Braconnage	
Destruction de l'habitat	

Actions prioritaires pour la conservation

Sensibilisation des populations, des touristes, des gardiens de la forêt et du personnel de l'ONAB.

Colobus vellerosus



Famille : Colobidae

Noms vernaculaires

Fon : To-klan,

Nagot : Aiya-dooungo

Etat de conservation

UICN : VU

Bénin : EN

Description

C'est un singe trapu, avec les membres postérieurs un peu plus long que les antérieurs, une tête plus arrondie que celle des cercopithèques et un museau court. Le pouce est considérablement réduit. Le colobe magistrat est surtout remarquable par sa robe noire, sa barbe blanche et sa queue blanche avec parfois un toupet terminal. Il atteint 50 à 67 cm de longueur avec une queue de 63 à 90 cm et un poids de 8 à 15 kg.

Ecologie

Le colobe magistrat est strictement arboricole. Son régime alimentaire est constitué surtout de végétaux. Les petits naissent entièrement blancs ; la mère les porte dans ses bras pendant la première semaine, avant qu'ils ne s'agrippent d'eux même à son pelage.

Distribution géographique dans la Lama

Le colobe magistrat est surtout inféodé au noyau central de la forêt classée de la Lama et précisément dans les parties les plus denses de la forêt autour des mares. Il est rarement observé dans les plantations de teck et sur les pistes.

Usages : Ecotourisme, médecine

Menaces

Menaces	Score
Braconnage	
Destruction de l'habitat	

Actions prioritaires pour la conservation

Sensibilisation des populations, des touristes, des gardiens de la forêt et du personnel de l'ONAB.